



D-CLOPROSTENOL

Acción.

Agente luteolítico para bovinos y porcinos.

Composición.

D-Cloprostamol sódico (equivalente a 7,5 mg de D-Cloprostamol base) 7,89 mg ; Excipientes c.s.p. 100 mL.

D-CLOPOSTRENOL es un agente luteolítico a base de D-cloprostamol, un análogo sintético de la prostaglandina F2 alfa. El enantiómero dextrógiro D-cloprostamol es la forma activa y por consiguiente es más potente. **D-CLOPROSTENOL** se presenta listo para usar en solución inyectable.

Indicaciones.

Biotécnicas: Sincronización e inducción del celo en vacas y vaquillonas. Sincronización del ciclo estral en donantes y receptoras en programas de transferencia de embriones. Inducción al parto en cerdas. **Terapéuticos:** Desórdenes funcionales de los ovarios. Celos silenciosos por anestro después del servicio o posparto. Ciclos irregulares o anovulatorios. Cuerpo lúteo persistente. Quistes lúteos. **Enfermedades puerperales:** Endometritis, piómetras. Abortos terapéuticos en el primer tercio de la gestación.

Dosis y vía administración.

Bovinos: 2 mL (0,150 mg) por vía intramuscular en la tabla del cuello o cuarto posterior.

Porcinos: 1 mL (0,075 mg) por vía intramuscular en la tabla del cuello por detrás de la oreja.

Periodo de retiro.

Entre el último tratamiento y la faena para consumo deben transcurrir 24 hs. Entre el último tratamiento y la utilización de la leche para consumo humano y/o industrialización deben transcurrir 4 hs.

Presentación. Frascos de 20 mL.